

コロナワクチン追加接種（3回目）に関するお知らせ



2月1日（火）から、2回目の接種から原則8か月以上を経過した18歳以上の一般の方を対象に、ワクチンの追加接種（3回目）を開始します。

1 予診票（接種券）発送スケジュールについて

1月11日（火）より予診票（接種券）の発送を開始しています。原則として、2回目の接種日順に、以下のとおり予約可能な範囲で順次小分けしてお送りします。

なお、新たな変異株の発生等に伴い、医療従事者、高齢者施設入所者・従事者は6か月、65歳以上の方は2月以降7か月経過後、予診票（接種券）が届いてからの接種が可能です。

65歳以上の方

2回目接種完了日	予診票（接種券）発送予定
令和3年5月末まで	発送済み
令和3年6月1日～	1月11日～
令和3年6月16日～	1月17日頃～
令和3年7月1日～	1月下旬～
令和3年8月1日～	2月中旬～
令和3年9月1日～	3月中旬～

64歳以下の方

2回目接種完了日	予診票（接種券）発送予定
令和3年5月末まで	発送済み
令和3年6月1日～	1月13日～
令和3年6月16日～	1月下旬～
令和3年7月1日～	2月中旬～
令和3年8月1日～	3月中旬～
令和3年9月1日～	4月中旬～

※65歳以上の方の予診票（接種券）は、前倒し接種に対応可能な時期に発送します。

※ワクチンの供給状況、予約状況によりスケジュールは前後する場合があります。

2 2月の接種スケジュール、使用するワクチンについて

2月の接種スケジュールは、以下のとおりです。また、国の方針により追加接種（3回目）では、ファイザー社及び武田／モデルナ社ワクチンを使用します。1・2回目の接種と異なるワクチンの交互相種が可能です。（例：1・2回目ファイザー→3回目モデルナ）

(1) 集団接種

接種場所	接種スケジュール	使用するワクチン
市健康センター	2月の土曜・日曜・祝日（2/5～）	武田／モデルナ

(2) 個別接種

接種場所	接種スケジュール	使用するワクチン
接種医療機関	2月1週目（2/1～）、3週目（2/14～）	ファイザー
	2月2週目（2/7～）、4週目（2/21～）	武田／モデルナ

※予約方法・接種医療機関等につきましては、接種券に同封のチラシまたは1月1号市報折込（保存版）をご覧ください。市ホームページ・予約サイトをご確認ください。

3 武田／モデルナ社ワクチンの特性について 裏面をご覧ください。（厚労省資料）

問合せ 天童市新型コロナウイルスワクチン接種対策室
0120-008-042（市コールセンター）

接種費用
無料
(全額公費)

追加（3回目）接種に使用するワクチン についてのお知らせ

2021年12月17日
厚生労働省作成資料抜粋

武田/モデルナ社のワクチンも 3回目の接種に使用できるようになりました



◎3回目の接種の安全性と効果

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社（2回目→3回目接種後の症状）	武田/モデルナ社（2回目→3回目接種後の症状）
50%以上	疼痛（78.3→83.0%）、疲労（59.4→63.7%）	疼痛（88.3→83.8%）、疲労（65.4→58.7%） 頭痛（58.8→55.1%）
10 - 50%	頭痛（54.0→48.4%）、筋肉痛（39.3→39.1%） 悪寒（37.8→29.1%）、関節痛（23.8→25.3%）	筋肉痛（58.1→49.1%）、関節痛（42.9→41.3%） 悪寒（44.3→35.3%）、リンパ節症（14.2→20.4%）
1 - 10%	38度以上の発熱（16.4→8.7%） 腫脹（6.8→8.0%）、発赤（5.6→5.9%） リンパ節症（※）（0.4→5.2%）	38度以上の発熱（15.5→6.6%） 腫脹・硬結（12.3→5.4%） 紅斑・発赤（8.7→4.8%）

(注) 対象/人数：ファイザー2回目 16～55歳/2,682人、ファイザー3回目 18～55歳/289人、モデルナ2回目 18歳以上/14,691人、モデルナ3回目 18歳以上/167人
(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： 5ポイント以上少ないもの、 5ポイント以上多いもの。
(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100µg、3回目は50µg接種している。
(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。

出典：特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果


英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン（※）を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること



(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50µg接種することになっているが、本研究では100µg接種した結果が報告されている。

出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

よくあるご質問

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。
(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果（※）が維持されています。
ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防（※）の効果が高いと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む。

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.